26. Schmucker-Weidelt-Kolloquium für elektromagnetische Tiefenforschung, 23.09.2015, Dassel

Das magnetische Joch und andere Gründe zur Betrachtung von MT-Quellsignalen

Anne Neska

Institut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

Diese Kiewer Konstruktion wird im Volksmund
als Joch bezeichnet, lateinisch “iugum”

Zwei unter einem Joch zusammengespante
Tiere heißen auf lateinisch “coniugati”

(Bild entfernt um Urheberrechtsprobleme auszuschließen)

“Konjugierte Punkte” gibt es auch im Geomagnetismus;
so nennt man die Fußpunkte einer Feldlinie

- In einem Medium, das durch ein Plasma in einem statischen Magnetfeld charakterisiert ist, können sich magneto hydrodynamische (MHD) Wellen ausbreiten.
- Stehende MHD-Wellen, die sich entlang der Hauptfeldlinien in der Plasmasphäre ausbreiten, werden auch als Feldlinienresonanzen bezeichnet; sie werden als Quellen der geomagnetischen Pulsationen (pc und pi, mit Perioden von 0,2 – 600 s) betrachtet.
- Diese Pulsationen sind das wichtigste Quellsignal für den kurzperiodischen LMT-Bereich.

Beispiele für INTERMAGNET-Observatorien an konjugierten Punkten

Pulsationen an konjugierten Punkten – Bsp. 1 (AIA – FRD, Entfernung: 11 500 km)

07.01.2013 03:02:30 - 07.01.2013 03:39:14 36m 44s

Pulsationen an konjugierten Punkten – Bsp. 2 (AIA – FRD, Entfernung: 11 500 km)

10.01.2013 20:39:12 - 10.01.2013 21:59:20 1h 20m 8s

Pulsationen an konjugierten Punkten – Bsp. 3 (AIA – FRD, Entfernung: 11 500 km)

22.01.2013 17:52:00 - 22.01.2013 19:03:28 1h 11m 28s

Eignet sich eine Station am konjugierten Punkt als Referenz für den Bereich der Pulsationen? Sondierungskurven aus Ostpolen:

Single-site mit
eindeutigen
Gleichstrombahn-
Verzerrungen

Eignet sich eine Station am konjugierten Punkt als Referenz für den Bereich der Pulsationen? Sondierungskurven aus Ostpolen:

Single-site mit
eindeutigen
Gleichstrombahn-
Verzerrungen

Klassisches RR
mit Referenz
aus der Region

Eignet sich eine Station am konjugierten Punkt als Referenz für den Bereich der Pulsationen? Sondierungskurven aus Ostpolen:

Single-site mit
eindeutigen
Gleichstrombahn-
Verzerrungen

Klassisches RR
mit Referenz
aus der Region

RR mit Referenz
vom konjugierten
Punkt auf den
Crozet-Inseln

- Pulsationen an konjugierten Punkten sind in ähnlichem Maße kohärent wie man es bei benachbarten Stationen erwarten würde.
- Daher eignen sich “konjugierte” Stationen prinzipiell als Referenzen im Rahmen des RR-Verfahrens. Dies gilt natürlich nur für den Periodenbereich der Pulsationen (0,2 – 600 s).

Schumann-Resonanzen: Grundlagen I

Maxima bei ca. 7, 14, 21 , ... Hz
im Amplitudenspektrum
(hier: Hx, Hornsund, Spitzbergen)

Schumann-Resonanzen: Grundlagen II

Die Aufzeichnungen verschiedener Stationen sind stark kohärent, da sie bestimmte Ereignisse zeitgleich sehen (HRN-Spitzbergen, BEL-Polen, TRM-Tarimbecken, China). Dies ermöglicht weltweites RR und sogar eine Bestimmung des Einschlagsortes.

Schumann-Resonanzen: Grundlagen II

Die Aufzeichnungen verschiedener Stationen sind stark kohärent, da sie bestimmte Ereignisse zeitgleich sehen (HRN-Spitzbergen, BEL-Polen, TRM-Tarimbecken, China). Dies ermöglicht weltweites RR und sogar eine Bestimmung des Einschlagsortes.

Blitze pro Jahr und km² (http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2004/0621lightning_prt.htm, Wikipedia)

Schumann-Resonanzen: Grundlagen II

Die Aufzeichnungen verschiedener Stationen sind stark kohärent, da sie bestimmte Ereignisse zeitgleich sehen (HRN-Spitzbergen, BEL-Polen, TRM-Tarimbecken, China). Dies ermöglicht weltweites RR und sogar eine Bestimmung des Einschlagsortes.

Blitze pro Jahr und km² (http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2004/0621lightning_prt.htm, Wikipedia)

Tageszeitabhängigkeit der Intensität der ersten Schumann-Resonanz-Mode (Hornsund, Spitzbergen, 13. 05. 2011)

Afrikanische Blitze verbessern nachmittags das Signal-Rausch-Verhältnis für Zxy in Europa:

Teil einer Sondierungskurve aus NW-Polen

Afrikanische Blitze verbessern nachmittags das Signal-Rausch-Verhältnis für Zxy in Europa:

Teil einer Sondierungskurve aus NW-Polen

Der Z_{xy} -Wert (single-site) bei 8 Hz dieser Station auf Grundlage von 20-min-Zeitreihen in Abhängigkeit von der Tageszeit

- Die zeitlich und räumlich ungleichmäßige Verteilung der Schumann-Resonanz-Quellen ist (bei entsprechender Bearbeitung) in den statistischen Eigenschaften von MT-Übertragungsfunktionen nachweisbar.
- Bei Problemen, die eine mögliche Nicht-Stationarität von Übertragungsfunktionen betreffen, sollte der Betrachtung der Quellen eine gewisse Bedeutung eingeräumt werden.

Eine

Danksagung

geht an

- **INTERMAGNET**, das Netzwerk für hohe Standards in der Observatoriumsarbeit, sowie die nationalen Institute, die die Observatorien betreiben, deren Daten hier verwendet wurden,
- **Jürgen Matzka** (*Deutsches GeoForschungsZentrum, Observatorium Niemegk*) für Hilfe beim Umgang mit geomagnetischen Koordinaten,
- **Mariusz Neska** (*Institut für Geophysik der Polnischen Akademie der Wissenschaften, Observatorium Belsk*), da er Abbildungen zum Thema Schumann-Resonanzen beigesteuert hat,
- **Vladimir Bakhmutov** (*Institute of Geophysics at the National Academy of Sciences of the Ukraine, Kiev*), **Vaclav Červ** (*Geophysical Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague*) und **Yixian Xu** (*Subsurface Multi-scale Imaging Laboratory of Hubei Province, China University of Geosciences, Wuhan*), da sie Daten zur Verfügung gestellt haben,
- **KNOW** (*Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący*), aus dessen Mitteln für das Zentrum für Polarstudien meine Teilnahme am Kolloquium finanziert wurde.